

## レジメン一覧【食道がん】

レジメン名	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	1コースの期間	制吐剤
FP	シスプラチン	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	120分	day1	28～35日	パロノセトロン、アプレピタント、デキサメタゾン
	フルオロウラシル	800 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	24時間keep	day1-5		
FP(RT併用)	シスプラチン	70 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	120分	day1	28～35日	パロノセトロン、アプレピタント、デキサメタゾン
	フルオロウラシル	700 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	24時間keep	day1-4		
FP+ペムブロリスマブ	ペムブロリスマブ	200 mg/body	点滴静注	30分	day1	21日	パロノセトロン、アプレピタント、デキサメタゾン
	シスプラチン	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	120分	day1		
	フルオロウラシル	800 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	24時間keep	day1-5		
FP+ニボルマブ	ニボルマブ	480 mg/body	点滴静注	30分	day1	28日	パロノセトロン、アプレピタント、デキサメタゾン
	シスプラチン	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	120分	day1		
	フルオロウラシル	800 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	24時間keep	day1-5		
CDGP+FU	ネダプラチン	90 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	120分	day1	28日	パロノセトロン、デキサメタゾン
	フルオロウラシル	800 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	day1-5		
Nivo+Ipi	ニボルマブ	360 mg/body	点滴静注	30分	day1,22	42日	-
	イピリムマブ	1 mg/kg	点滴静注	30分	day1		
Nivo(2week)	ニボルマブ	240 mg/body	点滴静注	30分	day1	14日	-
Nivo(4week)	ニボルマブ	480 mg/body	点滴静注	30分	day1	28日	-
PTX(weekly)	パクリタキセル	70 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	day1,8,15,22,29,36	56日	グラニセトロン、デキサメタゾン
DTX	ドセタキセル	70 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	day1	21日	グラニセトロン、デキサメタゾン
DTX(RT併用)	ドセタキセル	10 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	day1	21日	グラニセトロン、デキサメタゾン