

## レジメン一覧【泌尿器系がん】

### 《前立腺がん》

レジメン名	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	1コースの期間	制吐剤
DTX	ドセタキセル プレートニゾロン	75 mg/m <sup>2</sup> 10 mg/day	点滴静注 経口	60分 朝昼食後	Day1 Day1-21	21日	グラニセロン、デキサメタゾン
カバジタキセル	カバジタキセル プレートニゾロン	25 mg/m <sup>2</sup> 10 mg/day	点滴静注 経口	60分 朝昼食後	Day1 Day1-21	21日	デキサメタゾン
カバジタキセル	カバジタキセル プレートニゾロン	20 mg/m <sup>2</sup> 10 mg/day	点滴静注 経口	60分 朝昼食後	Day1 Day1-21	21日	デキサメタゾン
デガレリクス	デガレリクス	初回240 mg 維持① 80 mg 維持② 480 mg	皮下注		Day1 Day1 Day1	4週 12週	-
ゴセリン	ゴセリン ゴセリン LA製剤	3.6 mg 10.8 mg	皮下注		Day1 Day1	4週 12週	-
リュープロレリン	リュープロレリン	3.75 mg 22.5 mg	皮下注		Day1 Day1	4週 24週	-

### 《尿路上皮がん》

レジメン名	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	1コースの期間	制吐剤
GEM	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	Day1	21日	グラニセロン、デキサメタゾン
GC	ゲムシタビン シスプラチン	1000 mg/m <sup>2</sup> 70 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 点滴静注	30分 120分	Day1,8,15 Day2	21日	アプレピタント、グラニセロン、デキサメタゾン
GEM+CBDCA	ゲムシタビン カルボプラチン	1000 mg/m <sup>2</sup> AUC5	点滴静注 点滴静注	30分 120分	Day1,8,15 Day2	21日	アプレピタント、パロセロン、デキサメタゾン
Pembrolizumab (3week)	ペムブロリズマブ	200 mg	点滴静注	30分	Day1	3週	-
Pembrolizumab (6week)	ペムブロリズマブ	400 mg	点滴静注	30分	Day1	6週	-
AVE	アベルマブ	10 mg/kg	点滴静注	60分	Day1	14日	-
ニホルマブ (2week)	ニホルマブ	240 mg	点滴静注	30分	Day1	14日	-
ニホルマブ (4week)	ニホルマブ	480 mg	点滴静注	30分	Day1	28日	-
エンホルツマブペドチン	エンホルツマブペドチン	1.25 mg/kg	点滴静注	30分	Day1,8,15	28日	-

## レジメン一覧【泌尿器系がん】

### 《腎細胞がん》

レジメン名	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	1コースの期間	制吐剤
ニホルマブ(2week)	ニホルマブ	240 mg	点滴静注	30分	Day1	14日	デキサメタゾン
ニホルマブ(4week)	ニホルマブ	480 mg	点滴静注	30分	Day1	28日	-
ニホルマブ+イピリムマブ	ニホルマブ	240 mg	点滴静注	30分	Day1	21日	-
	イピリムマブ	1 mg/kg	点滴静注	30分	Day1	21日	